DRA. VANESSA FLORES
MÉDICA VETERINÁRIA

Conheça mais sobre

FIV e FELV



Doenças que existem, mas com informação e cuidado, o seu gato pode viver bem!

1. O que são?

FIV

Vírus da Imunodeficiência Felina

O FIV é um vírus que afeta o sistema imunológico do gato, deixando-o mais vulnerável a outras doenças. Ele não é transmissível para humanos ou outros animais (como cães).

FELV

Vírus da Leucemia Felina

O **FELV** pode causar anemia, alterações na medula óssea e aumentar o risco de desenvolvimento de tumores. Assim como o FIV, não é transmitido para humanos ou outros animais.

Ambos são vírus que comprometem a saúde do gato, mas com diagnóstico precoce e cuidados adequados, é possível oferecer uma boa qualidade de vida.

2. Como são transmitidos?

FIV

- Principalmente por mordidas profundas, que permitem o contato com o sangue do outro gato.
- Também pode ocorrer por contato com secreções (saliva, sangue) e, em casos raros, da mãe para os filhotes.

FELV

- Pela saliva, urina, fezes e contato com sangue de gatos infectados.
- É mais facilmente transmitido entre gatos que vivem juntos, principalmente em ambientes com muitos animais.
- A transmissão da mãe para os filhotes também é possível.

A castração e a testagem são aliadas importantes para reduzir o risco de transmissão.

3. Quais são os sinais e sintomas?

FIV

- Pode não apresentar sintomas por anos.
- Com o tempo, pode causar: perda de peso, infecções de repetição, gengivite, febre, anemia e apatia.

FELV

- Pode ser assintomático no início.
- Quando os sinais aparecem, podem incluir: perda de peso, anemia, febre, diarreia, problemas respiratórios e aumento dos linfonodos.

O diagnóstico precoce faz toda a diferença! Muitas vezes, o gato pode parecer saudável, mesmo estando infectado.

4. Como é o diagnóstico?

O diagnóstico é feito por meio de um exame de sangue, que detecta a presença dos vírus. É um exame simples, rápido e pode ser feito na consulta, especialmente em gatos:

- que vão morar com outros gatos;
- que têm acesso à rua;
- que apresentam sinais clínicos compatíveis;
- e antes de procedimentos, como castração.

Mesmo gatos que vivem apenas dentro de casa podem ser testados, pois o vírus pode ser introduzido no ambiente de outras formas.

5. Como prevenir?

Vacinação
Disponível para FELV e altamente recomendada para gatos com acesso à rua ou que convivem com outros gatos.

Evitar o contato com gatos infectados
Principalmente em ambientes com muitos animais.

Castração
Reduz comportamentos de risco e a chance de transmissão.

Testagem regular
Importante para gatos que vivem em grupos ou que têm acesso à rua.

Cuidar é prevenir e garantir mais anos de amor ao seu lado!

DRA. VANESSA FLORES
MÉDICA VETERINÁRIA